



ENGEMYCINE

Propriétés :

ENGEMYCINE est une solution injectable aqueuse, jaune clair, contenant 100 mg d'oxytétracycline par ml (s.f. chlorhydrate) sous forme d'un complexe stable avec le magnésium et le polyvinylpyrrolidone.

La formulation de l'ENGEMYCINE assure une bonne tolérance dans le site de l'injection. L'oxytétracycline est un antibiotique à large spectre d'action et est efficace contre un large nombre de microorganismes tels que Actinobacillus, Actinomyces, Anaplasma, Bordetella, Corynebacterium, Erysipelotrix, Haemophilus, Leptospira, Moraxella, et Listéria. Aussi, La majorité des espèces Bacillus, Chlamydia, Clostridium, Mycoplasma, Pasteurella, Streptocoques et Staphylocoques sont sensibles à l'oxytétracycline.

Compositions :

Oxytétracycline (s.f chlorhydrate)..... 10 g
Excipient q.s.p 100 ml

Indications :

Traitement des infections locales et systémiques causées par les bactéries sensibles à l'oxytétracycline chez les équidés, bovins, ovins, chiens et chats.

Posologie et Administration :

L' ENGEMYCINE peut être utilisée selon deux schémas : action de 24 h ou action prolongée (approximativement 48 h) après une seule injection.

	24 heures			Action prolongée		
	Voie	Mg/kg	ml/10kg	Voie	Mg/kg	ml/10kg
Bovin adulte	IV/IM	5	0,5	IM	10	1
bovin ≤ 200kg	IV/IM	10	1	IM	20	2
Cheval adulte	IV/IM	5	0,5	NON RECOMMANDE		
Poulain	IV/IM	10	1	NON RECOMMANDE		
Ovin	IV/IM	10	1	IM	20	2
Chien	IV/SC	10	1	NON RECOMMANDE		
Chat	SC	10	1	NON RECOMMANDE		

Temps d'attente :

Viande et abats :

Bovins ; ovins ; porcins : 21 jours

Lait

Bovins ; ovins : 5 jours





ENGEMYCINE

Conservation :

Conserver à une température comprise entre +15°C et +25°C et à l'obscurité.

USAGE VETERINAIRE

Précautions :

Les précautions habituelles d'asepsie doivent être prises lors de l'administration de l'injection.

Des injections intramusculaires ou sous cutanées répétées doivent être données à différents sites. Ne pas dépasser 20 ml dans le même site d'injection.

L'injection intraveineuse doit être donnée lentement.

Présentation :

ENGEMYCINE 10%. Flacons de 100 ml et 250 ml.

