



VONAPEN HL

Propriétés :

VONAPEN HL est une Pommade intramammaire antibiotique pour les vaches laitières en période hors lactation.

L'association de Pénicilline G et Néomycine est synergique. De plus, le spectre d'activité de ces deux antibiotiques est complémentaire. La pénicilline G reste l'un des meilleurs anti-streptococciques et l'apport de son sel potassique permet l'obtention rapide d'une concentration élevée d'antibiotique dans les canaux galactophores. La néomycine conserve toujours une excellente activité sur les staphylocoques pénicillino-résistants ou non. L'excipient au stéarate d'aluminium prolonge l'activité de la pénicilline G pendant trois semaines et de la néomycine pendant 8 semaines.

Compositions

Chaque applicateur de 9 g contient :

Benzylpénicilline G potassique500.000 UI

Benzylpénicilline procaïne1.000.000 UI

Néomycine base500 mg

Excipient q.s.p9g

Indications :

Traitement et prévention des mammites à staphylocoques et streptocoques en période de tarissement chez la vache laitière.

Posologie :

Traitement à effectuer le jour du tarissement aux environs du 7ème mois de gestation.

Mode d'administration :

Voie intramammaire :

- Bien désinfecter le trayon et son orifice
- Administrer un applicateur par quartier
- Injecter la totalité du produit

Temps d'attente :

Lait 0.

En cas de vêlage prématuré : Lait : 24 jours

Viande et abats : 30 jours.

Conservation :

Conserver à une température comprise entre +15°C et +25°C

NE PAS FAIRE AVALER.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

USAGE VETERINAIRE

Précautions :

- Bien désinfecter le trayon et son orifice
- Injecter la totalité de l'applicateur
- ne pas utiliser vonapen hl pour le traitement des mammites en lactation

Présentation :

Pommade intramammaire.

Boîte de 4 Applicateurs

