



# BOVILIS BOVIGRIP

## Propriétés :

Vaccin inactivé contre les affections respiratoires des bovins ou BPIE (Broncho-Pneumonies Infectieuses Enzootiques) dues aux virus BRSV et Parainfluenza-3 et à Mannheimia haemolytica

## Composition :

Suspension injectable :

Virus BRSV inactivé,

Souche EV908..... 1,98 - 4,16 unités VN1  
Virus

Parainfluenza-3 inactivé,

Souche SF4 Reisinger.....3,08 - 7,12 unités  
HI1

Mannheimia haemolytica inactivée, sérotypeA1..... 0,229 - 0,947  
DO2

Excipient q.s.p.....1 dose de 5 ml

1 - Titres sérologiques obtenus après immunisation de lapins.

2 - Densité optique mesurée lors du test de quantification ELISA.

## Indications :

Chez les bovins dès l'âge de 2 semaines, immunisation active contre les bronchopneumonies infectieuses enzootiques afin de :

- Réduire l'excrétion virale et les signes cliniques dus au virus respiratoire syncytial bovin,
- Réduire l'excrétion, les signes cliniques et les lésions dus à Mannheimia haemolytica,
- Réduire l'excrétion virale du virus Parainfluenza-3.

## Posologie :

Voie S.C. (au niveau de la face latérale du cou).

Bovins dès l'âge de 2 semaines: 1 dose de 5 ml par animal.

Schéma de vaccination : 2 injections à 4 semaines d'intervalle.

Pour une efficacité optimale, la vaccination doit être effectuée avant chaque période à risque et terminée 2 semaines avant celle-ci.

## Temps d'attente :

0 jour.

## Conservation :

Conserver au réfrigérateur entre + 2 °C et + 8 °C, à l'abri de la lumière.

Ne pas congeler.

Durée de conservation, flacon entamé : 3 heures.





# BOVILIS BOVIGRIP

## Précautions :

### • Précautions particulières d'emploi :

Seuls les animaux en bonne santé doivent être vaccinés.

Respecter les conditions habituelles d'asepsie.

Amener le vaccin à température ambiante et agiter le flacon avant injection.

Pour l'injection, il est recommandé d'utiliser des aiguilles de 1,5 à 2 mm de diamètre et de 10 à 18 mm de long.

### • Précautions en cas de gravidité ou de lactation :

BOVILIS® BOVIGRIP peut être utilisé en période de gestation et de lactation.

### • Interactions :

Aucune information sur l'innocuité et l'efficacité n'est disponible concernant l'usage simultané de ce vaccin avec d'autres vaccins.

### • Surdosage :

Aucun effet indésirable autre que ceux mentionnés à la rubrique "Effets indésirables" n'a été constaté après administration d'une double dose de vaccin.

### • Précautions particulières pour l'utilisateur :

En cas d'injection accidentelle du vaccin à l'homme, une consultation médicale est nécessaire.

### • Précautions particulières pour l'environnement :

Les flacons et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

## Présentation :

Boîte de 1 flacon de 10 doses

