



# BOVILIS BVD

## Propriétés :

Vaccin inactivé et adjuvé contre l'infection transplacentaire du fœtus par le virus de la diarrhée virale bovine (BVD).

## Composition :

Suspension injectable:

Antigène inactivé de la souche cytopathogène C-86 du virus de la BVD équivalent à 50 unités ELISA induisant au moins 4.6 log<sub>2</sub> unités VN

Aluminium (sous forme de phosphate et d'hydroxyde) .....6-9 mg

Excipient qsp.....1 dose de 2 ml

## Indications :

Chez les vaches et les génisses à partir de 8 mois :

Immunsation active contre l'infection transplacentaire du fœtus par le virus de la Diarrhée Virale Bovine.

## Posologie :

Dose de 2 ml par animal, par voie I.M.

Pour le choix du programme de vaccination en fonction de la taille du cheptel et de la gestion du troupeau, 2 régimes de vaccination sont proposées:

### • Vaccination individuelle

Primovaccination : 2 injections à 4 semaines d'intervalle. La seconde injection doit être réalisée au plus tard 4 semaines avant le début de la gestation.

Rappel : 1 injection 4 semaines avant le début de la gestation suivante.

### • Vaccination du troupeau

Tous les bovins de plus de 8 mois seront vaccinés :

Primovaccination : 2 injections à 4 semaines d'intervalle.

Rappel : 1 injection tous les 6 mois, indépendamment du stade de gestation.

Ce protocole présente l'avantage d'être simple et pratique.

## Temps d'attente :

0 jour.

## Conservation :

Conserver au réfrigérateur entre + 2 °C et + 8 °C, à l'abri de la lumière.

Ne pas congeler.

Durée limite d'utilisation : 10 heures après ouverture





# BOVILIS BVD

## Précautions :

- Précautions particulières d'emploi
  - Seuls les animaux en bonne santé doivent être vaccinés.
  - Respecter les conditions habituelles d'asepsie.
  - Avant l'utilisation, laisser le vaccin atteindre la température ambiante (15 °C-25°C)
  - Bien agiter avant l'emploi
  - Utiliser des seringues et des aiguilles stériles

## • Interactions

Aucune information n'est disponible sur la tolérance et l'efficacité lors d'utilisation simultanée de ce vaccin avec d'autres vaccins. Il est par conséquent recommandé de ne pas administrer d'autres vaccins dans les 14 jours précédant ou suivant la vaccination avec ce produit.

## • Précautions en cas de gravidité ou de lactation

BOVILIS® BVD peut être utilisé en période de gestation et de lactation

## • Surdosage

Aucun effet indésirable autre que ceux mentionnés à la rubrique "Effets indésirables" n'a été constaté après administration d'une double dose de vaccin.

## • Précautions particulières pour l'utilisateur

Aucune

## • Précautions particulières pour l'environnement :

Les flacons et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

## Présentation :

Flacons de 25 doses

