

Injection unique multiple solutions




Rheumocam®

5 mg/ml & 20 mg/ml solution injectable pour Bovins, Chevaux, Chiens et Chats

Une injection- Multiples solutions

- Inflammation aigue
- Inflammation chronique
- Analgésique
- Infection respiratoire aigue
- Diarrhée chez les veaux
- Mammite aigue
- Troubles locomoteurs
- Colique chez les équidés
- Douleurs post opératoires
- Processus douloureux



C'est quoi le Rheumocam® ?

Rheumocam® est à base de meloxicam, un Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien (AINS) de la famille des oxicams. Il agit par inhibition de la synthèse des prostaglandines, ce qui lui confère des propriétés anti-inflammatoire, anti-exsudative, antalgique et antipyrétique. À un moindre degré, il inhibe également l'agrégation plaquettaire induite par le collagène. Le méloxicam a également des propriétés anti-endotoxiques.

Quelles sont les indications du Rheumocam® ?

Bovins

Rheumocam® + Antibiotiques	Traite	Infections respiratoires
Rheumocam® + Réhydratation orale	Traite	Diarrhée des veaux
Rheumocam® + Antibiotiques	Traite	Mammites aiguës

Equins

Rheumocam®	Allège	Inflammations
Rheumocam®	Soulage la douleur	Troubles locomoteurs aigus et chroniques
Rheumocam®	Soulage la douleur	Coliques

Chiens

Rheumocam®	Soulage la douleur	Troubles locomoteurs aigus et chroniques
Rheumocam®	Soulage la douleur	Post opératoire

Chats

Rheumocam®	Soulage la douleur	Post opératoire
------------	--------------------	-----------------

Rheumocam® : Posologie

Bovins	SC ou IV	2,5 ml/100 kg PV
Equins	IV	3 ml/100 kg PV
Chiens	SC ou IV	0,4 ml/10 kg PV
Chats	SC	0,06 ml/ Kg PV

Délai d'attente

Bovins : viande et abats : 15 jours ; Lait : 5 jours

Equins : viande et abats : 5 jours ; Lait : ne pas utiliser chez la jument productrice du lait destiné à la consommation humaine.

Rheumocam 20mg/5mg : COMPOSITION : 20 mg/ml et 5 mg/ml de méloxicam. INDICATIONS : Bovins : Traitement adjuvant des infections respiratoires aiguës, des diarrhées et des mammites aiguës. Chevaux : Réduction de l'inflammation et de la douleur lors des troubles musculo-squelettiques et coliques. Chiens : Réduction de l'inflammation et de la douleur des troubles musculo-squelettiques et en postopératoire. Chats : Réduction de la douleur postopératoire. ADMINISTRATION ET POSOLOGIE : Bovins : Injection unique en SC ou IV de 0,5 mg de méloxicam/kg de poids vif (soit 2,5 ml/100 kg PV). Chevaux : Injection unique en IV de 0,6 mg de méloxicam/kg de poids vif (soit 3 ml/100 kg PV). Chiens : Injection unique en IV ou SC de 0,2 mg de méloxicam par kg de poids corporel (soit 0,4 ml/10 kg). Chats : Injection unique en SC de 0,3mg de méloxicam par kg de poids corporel (soit 0,6 ml/10 kg). TEMPS D'ATTENTE : Bovins : viande et abats : 15 jours ; lait : 5 jours. Chevaux : viande et abats : 5 jours. PRESENTATIONS : Flacon de 50 ml de Rheumocam 20 mg/ml (AMM N° 1632.2/14), Flacon de 10 ml de Rheumocam 5mg/ml (AMM N°1631.1/14). Veuillez lire la notice avant utilisation. Usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance.