



# Nobilis AE+POX

## Propriétés :

Nobilis AE+POX est un vaccin vivant lyophilisé associé contre l'Encéphalomyélite aviaire et la Variole de la volaille. Chaque dose contient au minimum 2,5 log<sub>10</sub> EID<sub>50</sub> du virus de l'Encéphalomyélite aviaire, souche 1143 (Calnek) et au minimum 2,8 log<sub>10</sub> EID<sub>50</sub> du virus de la variole de la volaille, souche Gibbs cultivée sur des œufs SPF.

## Indications :

Immunisation active des poulettes futures pondeuses et reproductrices et dindes reproductrices contre l'Encéphalomyélite aviaire et la Variole de la volaille. Les sujets vaccinés sont protégés contre la chute de ponte due à l'Encéphalomyélite. Les poussins des reproductrices vaccinées seront protégés contre cette maladie durant les premières semaines de vie grâce à l'immunité transmise par la mère.

## Programme de vaccination :

Les poulettes doivent être vaccinées entre la 8<sup>ème</sup> et la 16<sup>ème</sup> semaine d'âge.  
Les dindes doivent être vaccinées entre la 18<sup>ème</sup> et la 26<sup>ème</sup> semaine d'âge.

## Posologie :

Une dose vaccinale par sujet.

## Mode d'administration :

Préparation du vaccin : une ampoule de vaccin doit être reconstituée à l'aide du contenu d'une ampoule de solvant (UNISOL) immédiatement avant emploi.

Administration du vaccin : Le vaccin est administré dans la membrane alaire à l'aide d'un applicateur fourni avec le vaccin (méthode Wing Web). Tremper l'applicateur dans le vaccin reconstitué puis le piquer dans la membrane de l'aile.

7 à 10 jours après la vaccination, quelques oiseaux doivent être examinés pour la prise vaccinale. Une prise vaccinale satisfaisante est indiquée par un gonflement de la peau et une formation de croûte à l'endroit de la vaccination. Les croûtes disparaissent généralement 2 à 3 semaines après la vaccination.

L'immunité complète s'installe dans les 3 semaines qui suivent la vaccination.

## Conservation :

A conserver entre +2 et + 8°C, à l'abri de la lumière.

## Précautions :

- Vacciner seulement les oiseaux en bonne santé.
- Tous les sujets sensibles de la même exploitation doivent être vaccinés au même moment.
- Ne pas vacciner dans les 4 semaines qui précèdent le début de ponte ou pendant la période de ponte.
- Ne pas vacciner les poulettes moins de 8 semaines et les dindes moins de 18 semaines d'âge.

## Présentation :

Boîte d'un flacon de 1000 doses avec diluent UNISOL, un applicateur et un connecteur.

