



# HALOCUR

## Propriétés :

Halocur, est une solution orale pour le traitement et la prévention de la Cryptosporidiose chez le veau.

## Composition :

Solution orale:

Halofuginone base (sous forme de lactate).....0,50g

Excipients qsp .....1 ml

## Indications :

Chez les veaux nouveau-nés:

- Prévention de la diarrhée due à *Cryptosporidium parvum* diagnostiqué dans les élevages ayant un historique de cryptosporidiose.

Le traitement doit être instauré dans les premières 24 à 48 heures suivant la naissance.

- Réduction de la diarrhée due à *Cryptosporidium parvum* diagnostiqué.

Le traitement doit être instauré dans les 24 heures suivant l'apparition de la diarrhée.

Dans les deux cas, la réduction de l'excrétion d'oocystes a été démontrée

## Posologie et Administration :

Pour administration orale chez les veaux après le repas.

La posologie est : 100 µg d'halofuginone base par kg de poids vif, une fois par jour pendant 7 jours consécutifs, soit 2 ml d'HALOCUR pour 10 kg de poids vif, une fois par jour pendant 7 jours consécutifs.

Cependant, afin de faciliter le traitement par l'HALOCUR, un schéma de posologie simplifié est proposé :

- 35 kg < veaux ≤ 45 kg : 8 ml d'HALOCUR, 1 fois par jour pendant 7 jours consécutifs.
- 45 < veaux < 60 kg : 12 ml d'HALOCUR, 1 fois par jour pendant 7 jours consécutifs.

Pour les poids plus faibles ou plus élevés, un calcul précis de la dose doit être effectué (2 ml/10 kg).

Pour assurer une posologie correcte, l'utilisation d'une seringue ou d'un dispositif approprié à l'administration orale est nécessaire.

Les administrations consécutives doivent être effectuées au même moment de la journée.

Dès qu'un premier veau a été traité, tous les veaux nouveau-nés à venir doivent être systématiquement traités aussi longtemps que le risque de diarrhées dues à *C. parvum* persiste.

## Temps d'attente :

Viande et abats : 13 jours.





# HALOCUR

## Précautions :

- Un contact répété avec le produit peut provoquer des allergies cutanées.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer méticuleusement la zone exposée à l'eau claire. Si une irritation oculaire persiste, demander un avis médical.
- Porter des gants protecteurs pour manipuler le produit.
- Se laver les mains après utilisation.

## Présentation :

Solution orale, disponible en flacon portable en polyéthylène haute densité de :

- 500 ml contenant 490 ml de produit,
- 1 litre contenant 980 ml de produit.

La fermeture est composée d'un sellage en aluminium et un bouchon en polypropylène.

