



# Nobilis ILT

## Propriétés :

Nobilis ILT est un vaccin vivant lyophilisé contre la Laryngotrachéite Infectieuse de la volaille.

Chaque dose contient au moins 2.5 log<sub>10</sub> EID<sub>50</sub> du virus ILT, souche Serva cultivé dans des œufs embryonnés.

## Indications :

Prévention et vaccination d'urgence des poulets contre la laryngo-trachéite Infectieuse.

## Programme de vaccination :

Les oiseaux sensibles devront être vaccinés entre l'âge de 4 à 6 semaines et revaccinés entre 14 à 16 semaines.

En cas d'urgence, on peut intervenir plus tôt mais les oiseaux devront être revaccinés environ un mois avant l'entrée en ponte.

Dans les exploitations où on vient de constater l'apparition de foyer de laryngo-trachéite infectieuse, tous les sujets non protégés devront être vaccinés même s'ils apparaissent en bonne santé. Ainsi, la transmission de la maladie peut être limitée et les pertes réduites.

Après vaccination, l'immunité produite est précoce : 4 à 5 jours après l'intervention et elle dure pendant environ un an si les oiseaux sont vaccinés selon le programme de vaccination.

## Posologie :

Une dose par oiseau.

## Mode d'administration :

Par goutte oculaire.

## Conservation :

A conserver entre + 2 et + 8°C, à l'abri de la lumière.

## Précautions :

- Une fois dissous, le vaccin est très fragile, il doit être utilisé dans les 3 heures qui suivent sa mise en solution.
- Nobilis ILT ne doit pas être administré en même temps que d'autres vaccins à tropisme respiratoire. Respecter un intervalle de 14 jours entre de telles vaccinations.
- La vaccination peut provoquer une légère conjonctive transitoire chez certains oiseaux.
- Après la vaccination, se laver et se désinfecter les mains ainsi que le matériel. Les restes de vaccins doivent être détruits en les brûlant ou en les faisant bouillir.
- Ne vacciner que des animaux sains
- Les ampoules ouvertes doivent être utilisées immédiatement.

## Présentation :

Flacon de 1000 doses.

Boîte de 10 flacons.

