NOBIVAC RAGE

Propriétés :
Vaccin antirabique inactivé et adjuvé. Suspension injectable.
Chaque flacon d'une dose contient au moins 2 unités internationales immunisantes du virus de la rage, clone de la souche pasteur inactivé par le Béta-propiolactone et adjuvé avec du phosphate d'aluminium.

Composition :
Chaque dose de 1 ml contient :
Virus inactivé de la rage en suspension aqueuse avec 0,3 % d'adjuvant
Excipient q.s.p ..... 1 ml

Indications :
Immunisation active des carnivores domestiques, des bovins et des équidés contre la rage.

Posologie :
1 dose de vaccin de 1 ml quel que soit l'âge.
Injection sous-cutanée ou intramusculaire.
Ce vaccin est compatible avec les vaccins Nobivac DH2, PARVO 2, DH2 PARVO 2 et L ainsi qu'avec Nobivac TRICAT.

Indications :
Immunisation active des carnivores domestiques, des bovins et des équidés contre la rage.

Posologie :
1 dose de vaccin de 1 ml quel que soit l'âge.
Injection sous-cutanée ou intramusculaire.
Ce vaccin est compatible avec les vaccins Nobivac DH2, PARVO 2, DH2 PARVO 2 et L ainsi qu'avec Nobivac TRICAT.

Programme de vaccination :
Primo vaccination : 1 injection
Rappel annuel : 1 injection. Dans l'état actuel de la législation.

- Chiens et chats :
  - o Primo vaccination à partir du 3ème mois, une injection de 1 ml.
  - o Rappel annuel, une injection de 1 ml.
- Bovins :
  - o Primo vaccination à partir du 6ème mois, une injection de 1 ml.
  - o Rappel annuel, une injection de 1 ml.
- Equidés :
  - o Primo vaccination à partir du 6ème mois, une injection de 1 ml.
  - o Rappel annuel, une injection de 1 ml.

Conservation :
Tenir au frais, à l'obscurité entre +2° et +8°C. Ne pas congeler.
Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance.

Précautions :
- Agiter le flacon pour remettre le liquide en suspension.
- Ne vacciner que les animaux en bonne santé.
- Eviter toute contamination pendant la semaine qui précède la vaccination.
- En cas de vaccination des carnivores avant le 3ème mois, répéter l'injection après cette date.

Présentation :
Boîtes de 10 et 50 flacons de 1 dose.