

AVANT, CHOISIR
SON ENDECTOCIDE
C'ÉTAIT
COMPLIQUÉ...

MAIS ÇA
C'ÉTAIT
AVANT!

DECTOMAX[®] et CYDECTINE[®] 10% L.A.
L'alternative aux Ivermectines

Distribué par

*Pharmavet
Maroc*


L'expertise fait la différence




Bien Gérer le Parasitisme

zoetis

DECTOMAX® agit plus longtemps que la plupart des ivermectines



CYDECTINE 10% : Une rémanence record contre les infestations mixtes



L'Endectocide de référence pour un contrôle optimal du parasitisme

➤ **Efficacité** ➤ **Plus longue durée d'action** ➤ **Excellente tolérance**

Dectomax

Solution injectable

Composition : Doramectine : 10 mg, Excipients QSP 1 ml. **Espèces cibles :** Bovins, Ovins. **Indications :** Chez les bovins : Traitement curatif et préventif des infestations des nématodes gastro-intestinaux (adultes et 4ème stade larvaire), les nématodes de l'appareil respiratoire, les nématodes de l'œil, les hypodermes, les poux piqueurs, les acariens de la gale, et aide au contrôle des infestations par les parasites : Nématodes gastro-intestinaux (*Nematodirus helvetianus*), Poux broyeur (*Damalinia bovis*), Tique (*Ixodes ricinus*) et agents responsables de la gale (*Chorioptes bovis*). **Chez les ovins :** Traitement des infestations par les nématodes gastro-intestinaux (adultes et 4ème stade larvaire), les nématodes de l'appareil respiratoire (adultes et 4ème stade larvaire L4), les larves d'*Oestrus ovis* (larves L1, L2, L3) et infestations dues aux acariens responsables de la gale psoroptique (*Psoroptes ovis*). Veuillez Consulter la notice pour la liste détaillée des parasites. **Administration :** Traitement et contrôle des nématodes gastro-intestinaux, respiratoires, de l'œil, des hypodermes, des poux et des agents responsables de la gale chez les bovins et des nématodes gastro-intestinaux et des oestres chez les ovins, injection unique de 1 ml (10 mg de doramectine) pour 50 kg de poids vif, ce qui équivaut à 200 l/4g de doramectine par kg de poids vif, administré dans la région du cou par voie sous-cutanée chez les bovins et par voie intramusculaire chez les ovins. Traitement des signes cliniques de *Psoroptes ovis* (gale ovine) et élimination des agents de la gale, injection unique à la dose de 1 ml pour 33 kg de poids vif, ce qui correspond à 300 l/4g de doramectine par kg de poids vif, administré par voie intramusculaire dans le cou. De plus, des mesures de biosécurité doivent être mises en place pour éviter la réinfestation. Il est important de s'assurer que tous les ovins ayant été en contact avec des animaux infestés soient traités. Contre-indications, Précautions et Effets indésirables : Veuillez consulter la notice. **Présentation :** Flacon de 50 ml : AMM MAROC N°0426.1/96.

Tableau C : Produit à usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant le délai d'attente du produit.

CYDECTINE® 10% LA

Pour bovins, Solution injectable

Composition : Moxidectine : 100 mg, Alcool benzylique : 70 mg, Excipients q.s.p. : 1 ml. **Indications :** Chez les bovins de 100 à 500 kg, traitement curatif et préventif des infestations mixtes par les nématodes gastro-intestinaux, les nématodes de l'appareil respiratoire et certains parasites arthropodes. **Administration :** 0,5 ml de CYDECTINE 10% LA pour 50 kg de PV (soit 1 mg de moxidectine/kg de PV). **Contre-indications, Effets indésirables, Précautions :** Veuillez consulter la notice avant utilisation. Temps d'attente : Viande et abats : Bovins : 108 jours. **Présentations :** Flacon de 50 ml : AMM MAROC N°1603.1/14.

Tableau C. Produit à usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant le délai d'attente.