

ALFAcef

Ceftiofur Hydro chloride 50mg


Toute la Puissance du Ceftiofur...

Céphalosporines de Troisième Génération-large spectre



Infections
Respiratoires

Métrites
Puerpérales



Panaris
Interdigités

0 délai d'Attente dans le lait

ALFAcef: Ceftiofur Hydro chloride

ALFAcef à base de ceftiofur est un antibiotique appartenant à la famille des cephalosporines 3ème génération, caractérisé par leur large spectre, effet bactéricide et la résistance aux β lactamases.

ALFAcef: Indication

Bovins :

Traitement des infections Respiratoires

Traitement des métrites puerpérales

Traitement des panaris interdigités

ALFAcef: Posologie

Panaris Interdigités : 1 ml / 50kg pendant 3 jours en SC

Infections Respiratoires : 1 ml / 50kg pendant 3 à 5 jours en SC

Métrites puerpérales : 1 ml / 50kg pendant 5 jours en SC

ALFAcef: Delai d'Attente

Lait : 0 Jours

Viande et abats : 8 Jours

ALFAcef

Suspension injectable pour Bovins et Porcins

COMPOSITION : Chaque ml contient 50 mg de ceftiofur. **INDICATIONS** : Affections à germes sensibles au ceftiofur. **Bovins** : Traitement des infections respiratoires bactériennes associées à *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* et *Histophilus somni*. Traitement du panaris interdigité aiguë (nécrobacillose), à *Fusobacterium necrophorum* et *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*). Traitement de la composante bactérienne de la métrite aiguë post-partum (puerpérale) dans les 10 jours après le vêlage, associée à *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* et *Fusobacterium necrophorum*, sensibles au ceftiofur. L'indication est limitée aux cas dans lesquels un traitement par un autre agent antimicrobien a échoué. **Porcins moins de 125 kg** : Traitement des infections respiratoires bactériennes associées à *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumonie* et *Streptococcus suis*. **TEMPS D'ATTENTE** : **Bovins** : Viande et abats : 8 jours. Lait : Zéro heure. **Porcins** : Viande et abats : 8 jours. **PRESENTATIONS** : Flacon de 50 ml, AMM Maroc N°1858.1/16, Flacon de 100 ml, AMM Maroc N°1858.2/16, Flacon de 250 ml, AMM Maroc N°1858.3/16, Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. **ADMINISTRATION ET POSOLOGIE**, **CONTRE-INDICATIONS**, **EFFETS SECONDAIRES ET PRECAUTIONS** : Veuillez lire la notice avant utilisation.

Usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant le délai d'attente du produit.



L'expertise fait la différence

Pharmavet Maroc S.A.

Lot. 349 - 350; Parc industriel Sapino

BP 27000 - Nouaceur

Tél. : (0522) 34 10 88 / 34 32 29

Fax : (0522) 66 15 48

www.pharmavetmaroc.com