

Nobivac[®]



Tricat Trio

Vous l'aimez,
Vous le protégez



Pharmavet
Maroc

L'expertise fait la différence

MSD
Santé Animale

Protection efficace contre

*le Calicivirus félin
l'Herpèsvirus félin type 1,
le Parvovirus félin*

- La souche vaccinale FCV-F9 induit une protection contre les souches terrain actuelles de FCV¹.
- Vaccins vivants atténués.
- 3 ans de durée d'immunité FPV.
- 1 an de durée d'immunité FCV, FHV.
- Indiqués à partir de l'âge de 8 semaines.

**SANS
ADJUVANT**

8 - 9 Semaines

12 Semaines

1 An

**Rappels
Annuels**

PRIMO-VACCINATION

RAPPELS

FCV : Calicivirus Félin
FHV : Herpèsvirus Félin de Type 1
FPV : Parvovirus Félin

NOBIVAC® TRICAT TRIO

FCV : Calicivirus Félin
FHV : Herpèsvirus Félin de Type 1
FPV : Parvovirus Félin
+
Rage

**NOBIVAC® TRICAT TRIO
+
NOBIVAC® RAGE**

FCV : Calicivirus Félin
FHV : Herpèsvirus Félin de Type 1
FPV : Parvovirus Félin
+
Rage

**NOBIVAC® TRICAT TRIO
+
NOBIVAC® RAGE**

1 M. Afonso et al., A multi-national European cross-sectional study of feline calicivirus epidemiology, diversity and vaccine cross-reactivity. *Vaccine*, 2017
2 M. J. Day, et al. WSAVA Guidelines for the vaccination of dogs and cats. *J. Small Anim. Pract.* 2016; 57

NOBIVAC TRICAT TRIO. Lyophilisat et solvant pour suspension injectable. **Composition** : Calicivirus félin vivant atténué, souche F9 au moins 4,6 log₁₀ UFP*. Virus herpès vivant atténué type 1, souche G2620A au moins 5,2 log₁₀ UFP*. Virus vivant atténué de la Panleucopénie féline, souche MW-1 au moins 4,3 log₁₀ DICCS50**.(*) Unité formant plages. (**) Dose infectieuse sur culture cellulaire. **Indications** : Chez les chats : Immunisation active en vue de Réduire les signes cliniques causés par l'infection par le calicivirus félin et par le virus herpès félin de type 1 et prévenir les signes cliniques, de la leucopénie et l'excrétion virale causés par l'infection par le virus de la panleucopénie féline. **Contre-indications, Effets indésirables et Précautions particulières d'emploi** : Voir notice. **Posologie, mode et voie d'administration** : Après reconstitution par le solvant Nobivac Solvant, utiliser 1 dose par sujet. Programme de vaccination : Voir Notice. Précautions de conservation : conserver entre +2°C et +8°C. Protéger de la lumière. **Présentation** : Boîte de 10 doses de lyophilisat et de 10 doses de solvant : **AMM Maroc N° 2056.2/19**. Fabriqué par Intervet International BV, BOXMEER, Pays-Bas. Produit à usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance.

NOBI-VAC® SOLVANT CANINS FELINS. **Composition** : solution : phosphate monopotassique 0,21 mg. Phosphate disodique dihydraté 0,31 mg. Eau ppi. Excipient q.s.p. 1 ml. **Indications** : remise en suspension des vaccins NOBIVAC destinés aux chiens et aux chats. **Contre-indications** : ne pas utiliser seul. **Effets indésirables** : non connus. **Usage vétérinaire.** Intervet - 49071 BEAUCOUZE CEDEX - France.

NOBIVAC RAGE. Suspension injectable. **Composition** Suspension d'antigène inactivé du virus de la rage (souche Pasteur) ≥ 2 UI. **Indications** : **Chez les chiens, les chats, les bovins et les équins** : Immunisation active contre la rage. **Contre-indications** : Aucune. **Effets indésirables, Précautions particulières d'emploi** : Voir Notice. **Posologie, mode et voie d'administration** : 1 dose de 1 ml, par voie intramusculaire ou sous-cutanée. **Programme de vaccination** : Voir Notice. **Temps d'attente** : Bovins et équins : zéro jour. **Précautions de conservation** : conserver entre +2 à +8 °C. Ne pas congeler. **Présentation** : Boîte de 10 flacons de 1 dose : **AMM Maroc N° 0523.2/97**. Fabriqué par Intervet International BV, BOXMEER, Pays-Bas. Produit à usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance.