


Nouvelles solutions

Anesthésiantes

pour toutes

chirurgies



L'expertise fait la différence

Pharma Ketamine 10% : 

Indication :

La Kétamine est un anesthésique général à action rapide pour chiens et chats.

La durée de l'anesthésie est d'environ 10 à 30 minutes. Le réveil prend environ 30 à 60 minutes.

- **Pharma Ketamine 10%** en utilisation seule:
Pour induire une anesthésie lors d'un examen à courte période chez des animaux agités, diagnostic par rayons X ou changement de pansement.

- **Pharma Ketamine 10%** en association avec **Pharma Xylazine 2%** :

Pour obtenir une anesthésie générale et une analgésie, de chirurgies (à courte période) telles que l'ovariectomie, la castration, la césarienne, la chirurgie de la mâchoire, l'extraction de dent, la chirurgie des yeux, du nez ou des oreilles, le nettoyage des dents ou l'ouverture d'un abcès.

Posologie:

Chien: 5-15 mg de kétamine par kg de poids corporel par voie intramusculaire.

Chat: 15 mg de kétamine par kg de poids corporel par voie intramusculaire.

- Pour une combinaison chez le chien, il est recommandé:
 - 8 à 20 mg de kétamine par kg de poids corporel.
 - 1 à 2 mg de Xylazine par kg de poids corporel par voie intramusculaire ou sous cutanées.
- Pour la combinaison chez le chat, il est recommandé:
 - 15 à 20 mg de kétamine par kg de poids corporel.
 - 0,5 mg de xylazine par kg de poids corporel par voie sous-cutanées.

Pharma KETAMINE 10%

COMPOSITION : Chaque ml de la solution contient : Substance active : Kétamine ... 100,0 mg. **ESPECES CIBLES** : Chiens et chats. **INDICATIONS** : Pour induire une anesthésie lors d'un examen à court terme chez des animaux agités, diagnostic par rayons X ou changement de pansement. Pour l liste complète les indications, veuillez lire la notice. **CONTRE-INDICATIONS** : Ne pas utiliser lors les troubles rénaux et hépatiques ; en cas d'insuffisance cardiaque congestive ; en chirurgie intracrânienne ou en traumatisme crânien ; dans le glaucome ; et en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. **POSOLOGIE ET MISE EN GARDE PARTICULIERE** : Veuillez lire la notice avant utilisation. **CONSERVATION** : Conserver à une température inférieure à 25°C. Ne pas réfrigérer ; Ne pas congeler. Après ouverture de flacon 1 mois à température entre +2°C et +8°C. **PRESENTATIONS** : Flacon de 10 ml.

TABLEAU B. Usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance.

Pharma XYLAZINE 2%

COMPOSITION : Chaque ml de la solution contient : Substance active : Xylazine 20,0 mg, Excipient :Parahydroxybenzoate de méthyle (E218) 1,5 mg **ESPECES CIBLES** : Bovins, équins, ovins, chiens et chats. **INDICATIONS** : Toutes les indications pour lesquelles il est nécessaire une myorelaxation : le transport, les animaux excités, la parturition, la chirurgie, ou une prémédication lors d'une anesthésie générale. **CONTRE-INDICATIONS** : Ne pas utiliser pendant le dernier mois de gestation, ou lors d'affections cardiaques ou pulmonaires. **POSOLOGIE ET MISE EN GARDE PARTICULIERE** : Veuillez lire la notice avant utilisation. **CONSERVATION** : Conserver à une température inférieure à 25°C. Après ouverture de flacon 28 jours à température entre +2°C et +8°C. **PRESENTATIONS** : Flacon de 30 ml

TABLEAU A. Usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance.

Pharma Xylazine 2% : 

Indication :

Sédatif, analgésique, anesthésique et relaxant musculaire chez les chiens, chats, chevaux et bovins.

Toutes les indications pour lesquelles il est nécessaire une myorelaxation : le transport, les animaux excités, la parturition, la chirurgie, ou une prémédication lors d'une anesthésie générale.

Posologie:

- **Chiens:** intraveineuse ou intramusculaire 0,15 ml / kg p.c.
- **Chats:** intramusculaire 0,15 ml / kg p.c.
- **Chevaux:**
 - Par voie intraveineuse 4 ml / 100 kg p.c.
 - Par voie intramusculaire 10 ml / 100 kg p.c.
- **Bovins:** par voie intramusculaire: sédation 0,25 ml/ 100 kg p.c.
 - Petite chirurgie 0,50 ml / 100 kg p.c.
 - Chirurgie majeure 1,00 ml / 100 kg p.c.

